

Фамилия

1

0196180

Дата рождения (дд.мм.гг.)

## День цикла / срок беремен.

Контактный телефон пациента

## Пункты Перми и Пермского края:

 Данные пункты работают **без выходных!**

Сайт	Типы контейнеров для взятия биоматериала	Код	Цена
	Транспортная среда (ТУБФЕР)	20.01	Взятие крови 120
	Транспортная система (с жидкой транспортной средой)	20.02.00	Взятие мазков 140
	Стерильный одноразовый контейнер	20.06.01(02)	Инъекция 200
	Стерильный одноразовый контейнер с ложечкой	20.03.01	Снятие клаеща 200

ул. Газеты Звезда, 30	ул. Кубышева, 97	ул. Леонова, 23	ул. Ким, 49
ул. Ленина, 10	ул. Островского, 49	ул. Леонова, 45	ул. Ушинского, 4
ул. Ленина, 82	ул. 40-я Победы, 10 (Лады)	шоссе Космонавтов, 121	ул. Гашкова, 20
ул. Попова, 52	ул. Василия Тatischeва, 8	пр. Декабристов, 22	ул. Макаренко, 54
ул. Героев Хасана, 1 <b>УЗИ</b>	ул. Калеева, 20	ул. Карпинского, 14	ул. Инская, 18
25 октября, 40 А	ул. Маршала Рыбалко, 74	ул. Карпинского, 50	ул. Сакко Ванцetti, 93 А
ул. Чернышевского, 15	пр. Парковый, 31/1	ул. Карпинского, 112	ул. Целинная, 43/1
ул. Белинского, 31	пр. Парковый, 28 А	ул. Вильямса, 4	ул. Сапfirианая, 13
ул. Холмогорская, 4 В	ул. Барамзиной, 38	ул. Веденеева, 41	ул. Восточная, 8
ул. Лодыгина, 26	ул. Малкова, 12	ул. Молдавская, 4	ул. Камская, 7 (Кондратово)
ул. Суздальская, 4/23	ул. Мишальская, 19	ул. Уральская, 115/	ул. Нижнемулинская, 8 (Куптаво
ул. Серпуховская, 17	ул. Докучаева, 32	ул. Крупской, 26 <b>УЗИ</b>	ул. Победы, 18 (Усть-Качка)
ул. Революции, 5	ул. Ленина, 83	ул. Аркадия Гайдара, 14 А	ул. Центральная, 24/1 (Лобаново)
ул. Куйбышева, 10	ул. Плеханова, 58 А	ул. Уральская, 95	пгт. Звездный, 16, Ленин, 16
<b>Барда:</b> ул. Фрунзе, 5	<b>Кудымкар:</b> ул. Даниилова, 14 А	<b>Соликамск:</b> ул. Советская, 53	
<b>Березники:</b> ул. Платовцев, 22	ул. М.Горького, 22	ул. Свердлова, 47 (м-н Боровской)	
ул. Юрийевская, 119	ул. К.Маркса, 14	ул. К.Маркса, 41	
ул. И.Дашкевича, 9	ул. Металлистов, 26	ул. Коммунистическая, 6	
<b>Туба:</b> ул. Кирза, 3 <b>УЗИ</b>	ул. Чапаева, 21	ул. Строительная, 8	
<b>Добринка:</b> ул. Советская, 72	пр. Ленина, 5	Приморский бульвар, 29	
<b>Краснокамск:</b> ул. Чапаева, 1	ул. Генерала Богомягкова, 8	ул. Коммунистическая, 18 А	
<b>Кунгур:</b> ул. Красная, 21	ул. Степана Разина, 81 А	ул. Красногорская, 90 А	
ул. Просвещения, 7 А	ул. Петякина, 56	ул. Ленина, 22	
	<b>Полазна:</b>	ул. Ленина, 50 лет ВЛКСМ, 25 <b>NEW</b>	

## Исследования с определением чувствительности к антимикробным препаратам (расширенный спектр)

## Идентификация микроорганизмов методом MALDI-TOF (масс-спектрометрия) на анализаторе Vitek MS (bioMerieux) Франция

## **Исследования с определением чувствительности к бактериофагам (АО НПО «Микроген»)**

код	цена	
23.01	1910	Кал на дисбактериоз
23.02	1700	Кал на УПМФ
23.03	950	Кал на патогенную микрофлору (сальмонеллы, шигеллы)
23.04	1070	Кал на иерсинии
23.05	950	Кал на золотистый стафилококк ( <i>Staphylococcus aureus</i> )
23.20	1910	Исследование микроценоза влагалища
23.32	1910	Исследование микроценоза ротовой полости

	код	цена	✓
30.01	1430		
30.02	1380		
30.03	900		
30.04	1010		
30.05	900		
30.20	1590		
30.32	1590		
30.33			

## Исследования с определением чувствительности к антимикробным препаратам (расширенный спектр)

Тестирование на чувствительность к антибиотикам выполнено диско-диффузионным методом на анализаторе антибиотикограмм ADAGIO (Bio-Rad) Франция

## Исследования с определением чувствительности к антибиотикам (основной спектр)

23.07	1380	Моча на микрофлору
23.10	1700	Мокрота, БАЛЖ на микрофлору
23.31	1380	Исследование на легионеллы (Legionella) мокроты, БАЛЖ Посев на Mycoplasma pneumoniae с определением чувстви
23.11.01	1380	Отделяемое левого уха на микрофлору
23.11.02	1380	Отделяемое правого уха на микрофлору
23.12	1380	Отделяемое носа на микрофлору
23.13	1380	Отделяемое зева на микрофлору
23.14	1380	Отделяемое миндалин на микрофлору
23.33	1380	Посев с поверхности языка на микрофлору
23.16.01	1380	Отделяемое конъюнктивы левого глаза на микрофлору
23.16.02	1380	Отделяемое конъюнктивы правого глаза на микрофлору
23.17	1380	Отделяемое влагалища на микрофлору
23.18	1380	Отделяемое цервикального канала на микрофлору
23.19	1380	Отделяемое уретры (жен) на микрофлору
23.21	1380	Отделяемое уретры (муж) на микрофлору
23.22	1380	Исследование эякулята на микрофлору
23.23	1380	Исследование секрета простаты на микрофлору
23.24.01	1380	Исследование грудного молока (левая МЖ, одна проба) на
23.24.02	1380	Исследование грудного молока (правая МЖ, одна проба) на
23.25	1380	Исследование отделяемого других органов и тканей на ми (указать вид биоматериала):
23.27.01	1380	Исследование на MRSA Staphylococcus aureus
23.28	1170	Посев на стрептококк группы А (Streptococcus pyogenes)
23.29	1170	Посев на стрептококк группы В (Streptococcus agalactiae)
23.30	1170	Посев на гемофильтрую палочку (Haemophilus influenzae)
23.08	2540	Кровь на стерильность с использованием транспортной си
23.09	2540	Кровь на гемокульттуру (тиф, паратиф) с использованием Посев отделяемого на анаэробную микрофлору (указать в
		Исследование на дифтерийную палочку (Corynebacterium diphtheriae)

	30.07	1050
	30.10	1480
ельности к антибиотикам	23.34	1270
	30.11.01	1050
	30.11.02	1050
	30.12	1050
	30.13	1050
	30.14	1050
	30.33	1050
	30.16.01	1050
	30.16.02	1050
	30.17	1050
	30.18	1050
	30.19	1050
	30.21	1050
	30.22	1050
	30.23	1050
микрофлору	30.24.01	1050
микрофлору	30.24.02	1050
офлору	30.25	1050
	30.27.01	1050
	30.28	950
	30.29	950
	30.30	950
темы		
транспортной системы		
д биоматериала):	30.31	1170
ophtheriae) зев + нос	30.15	1050

## **Исследования (без определения чувствительности)**

30.27.02	600	Отделяемое зева на <i>Staphylococcus aureus</i> .
30.27.03	800	Отделяемое носа на <i>Staphylococcus aureus</i> .
23.06	1700	Исследование кала на определение антигена токсинов А и В.
23.15.01	2440	Выявление антигена бактерий <i>Legionella pneumophila</i> серогруппы 4.
23.15.02	1430	Выявление антигена бактерий <i>Legionella pneumophila</i> серогруппы 1.
23.15.03	1430	Выявление антигена бактерий <i>Streptococcus pneumoniae</i> в пневмопатологии.

НИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

30.37	Люминесцентная микроскопия с окрашиванием калькофлюором белым на патогенные грибы: <input type="checkbox"/> волосы с волосистой луковицей <input type="checkbox"/> соскоб с ногтевой пластины <input type="checkbox"/> соскоб с кожи	690
<b>Микологические исследования с определением чувствительности к антимикотическим препаратам</b>		
30.06	Микологическое исследование (посев) кала на дрожжевые и плесневые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам	1050
30.26	Микологическое исследование (посев) на дрожжевые грибы (родов Candida spp., Cryptococcus spp. и других) с определением чувствительности к антимикотическим препаратам	1050
30.42	Микологическое исследование (посев) на дрожжевые грибы (родов Candida spp., Cryptococcus spp. и других) с подбором минимальной эффективной дозировки антимикотических препаратов МПК Bio-Rad Фунгитест	2110
30.40	Микологическое исследование (посев + микроскопия) на дрожжеподобные липофильные грибы Malassezia spp. с определением чувствительности к антимикотическим препаратам	1380
30.41	Комплексное микологическое исследование (посев + микроскопия) на дерматофиты, дрожжевые грибы, дрожжеподобные грибы Malassezia spp. и плесневые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам грибов рода Candida spp. и дрожжеподобных грибов	2010

МИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К АНТИМИКОТИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТАМ

30.38	Микологическое исследование (посев + микроскопия) на плесневые грибы <i>Aspergillus</i> spp. без определения чувствительности к антимикотическим препаратам	1380
30.39	Микологическое исследование (посев + микроскопия) на возбудителей дерматомикозов ( <i>Trichophyton</i> spp., <i>Microsporum</i> spp., <i>Epidermophyton</i> spp.) без определения чувствительности к антимикотическим препаратам	1380

- При идентификации плесневых грибов, чувствительность к антимикотическим препаратам не определяется.
  - При получении роста нормальной микрофлоры определение антибиотикочувствительности не производится.
  - **Бактериофаг** - Чувствительность определяется у тех видов микроорганизмов к которым есть промышленные препараты. Правила подготовки к сдаче анализов и режим работы уточняйте на сайте: [www.medlabexpress.perm.ru](http://www.medlabexpress.perm.ru)

Данная информация носит справочный характер и не является официальной офертой.

Актуальную информацию уточняйте на сайте  
**[www.medlabexpress.perm.ru](http://www.medlabexpress.perm.ru)** от 01.12.2025 г.

# Микробиологическая лаборатория ООО «МедЛабЭкспресс» обращает внимание :

Общие требования к сбору и транспортировке проб биологического материала для микробиологических исследований:

1. Для получения достоверного результата исследования рекомендуется проводить до начала курса антимикробной терапии или не менее чем через 2 недели после его завершения.
2. Сбор биоматериала производится в стерильный пластиковый контейнер в заводской упаковке во избежание загрязнения пробы биологического материала посторонней микрофлорой, так как ее наличие может привести к получению ошибочных результатов анализа.
3. Проба должна быть отобрана в количестве (вес, объем), достаточном для выполнения анализа. Недостаточное количество образца, может привести к некорректным результатам исследования.
4. Доставку в лабораторию осуществляют в максимально короткие сроки, хранение не более 2 часов при t 20-25°C.

## 1. Правила для самостоятельного сбора приносного биоматериала на микробиологические исследования

### ■ КАЛ на дисбактериоз и УПМФ

#### Биоматериал необходимо собирать утром, после естественной дефекации

За 1-3 дня до взятия пробы пациент должен находиться на диете, исключающей прием продуктов, усиливающих процессы брожения в кишечнике, кисло-молочных продуктов, алкоголя.

Необходимо исключить прием слабительных препаратов, введение ректальных свечей, масел, ограничить прием медикаментов, влияющих на перистальтику кишечника (белладонна, пилокарпин) и на окраску кала (железо, висмут, сернокислый барий), в течение 72 часов со сбора кала.

Кал собирают на чистую поверхность из полиэтилена или бумаги. При использовании судна, его предварительно хорошо промывают с мылом и губкой, ополаскивают многократно водопроводной водой, а потом обдают кипятком и остужают. Кал собирают в стерильный контейнер в заводской упаковке, преимущественно из средней порции, специальной ложечкой, вмонтированной в крышку стерильного контейнера. Не менее 1/3 от объема контейнера. Во время сбора избегать примесей мочи, отделяемого половых органов. У маленьких детей допускается собирать материал со стерильной сухой пелёнки, не касаясь ткани.

### ■ МОКРОТА

Исследование подлежит первая утренняя порция мокроты.

Перед откашиванием необходимо почистить зубы и прополоскать рот кипяченой водой с целью механического удаления остатков пищи и микрофлоры ротовой полости. Следите за тем, чтобы в контейнер не попала слюна и носоглоточная слизь (особенно при насморке!). Сбор биоматериала производить после глубокого откашивания (чтобы получить биоматериал из нижних дыхательных путей) в стерильный контейнер в заводской упаковке. Не касайтесь внутренней поверхности крышки и стенок стерильного контейнера пальцами. Плотно закройте контейнер крышкой.

### ■ ГРУДНОЕ МОЛОКО

Отбор грудного молока производится в день сдачи анализа, до кормления ребенка

или через два часа после кормления грудью. Молоко из правой и левой молочных желёз исследуют раздельно. Молоко из молокоотсоса не подлежит исследованию! Перед сцеживанием молока руки и молочные железы тщательно моют с мылом, обрабатывают соски и околососковую область ватными тампонами, смоченными 70% спиртом (каждая железа обрабатывается отдельным тампоном).

Начальная порцию 5-10 мл сцеживают в отдельную посуду (так как эта порция молока не пригодна для исследования), последующие 4-5 мл сцеживают в стерильный контейнер, стараясь при этом не касаться краев контейнера телом. Каждый контейнер маркируется: «правая молочная железа» или «левая молочная железа».

## 2. Правила подготовки к микробиологическим исследованиям при заборе биоматериала на пункте

### При исследовании отделяемого ЛОР-органов:

**уха** - накануне и в день исследования запрещается применять мази, ушные капли и проводить туалет наружного уха. Необходимо исключить любые местные процедуры (промывание)

**носовых ходов** - в день исследования запрещается промывать полость носа и использовать назальные капли, спреи

**слизистой оболочки зева, миндалин, поверхности языка** - проводят натощак или не ранее чем через 2 часа после приема пищи или питья, нельзя полоскать рот и горло, чистить зубы, курить

**глаз** - нельзя применять глазные капли, мази. Пациент приходит для взятия биоматериала в процедурный кабинет до проведения утреннего туалета

## 3. Правила подготовки к микологическим исследованиям

Специальной подготовки к проведению микологического исследования не требуется. За 3 дня до сдачи соскоба, посева нужно отказаться от использования любых лекарственных средств, эффективность которых может отрицательно повлиять на результаты анализов (мази, лаки и противогрибковые препараты). Допускается принять обычный гигиенический душ без использования моющих средств. Для исследования на грибы важно правильное взятие материала с пораженного участка.

### Преимущество исследования на микрофлору с определением чувствительности к РАСШИРЕННОМУ СПЕКТРУ АНТИМИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ (антибиотики, антимикотики, бактериофаги) по сравнению с исследованием на определение чувствительности к ОСНОВНОМУ СПЕКТРУ АНТИМИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ (только антибиотик).

#### РАСШИРЕННЫЙ СПЕКТР

\*определение чувствительности микроорганизмов до 12 антибиотиков

\*определение чувствительности дрожжевых и дрожжеподобных грибов к антимикотикам

#### ОСНОВНОЙ СПЕКТР

\*определение чувствительности микроорганизмов до 6 антибиотиков

Результат выдается в виде критических значений (чувствительный, резистентный). При обнаружении микроорганизмов, составляющих нормальную микрофлору, чувствительность к антибиотикам не определяется так как не имеет диагностического значения. При идентификации плесневых грибов, чувствительность к антимикотическим препаратам не определяется.

\* При идентификации плесневых грибов, чувствительность к антимикотическим препаратам не определяется

\* При получении роста нормальной микрофлоры определение антибиотикочувствительности не производится

\* **БАКТЕРИОФАГ**- чувствительность определяется у тех видов микроорганизмов к которым есть промышленные препараты