НАПРАВЛЕНИЕ в медицинскую лабораторию МЕДЛАБЭКСПРЕСС

8 (342) 240-40-40, 8 (800) 222-20-40 (Звонок бесплатный)

Фамилия

Имя

Отчество

пол

Дата рождения (дд.мм.гг.) | День цикла / срок беремен. | Контактный телефон пациента

Врач (фамилия, имя, отчество) | Номер полиса

Сайт

	Типы контейнеров для взятия биоматериала
	Питательная среда
	Транспортная среда
	Стерильный одноразовый контейнер
	Стерильный одноразовый контейнер с ложечкой

Код		Цена
20.01	Взятие крови	130
20.02.00	Взятие мазков	150
20.06.01(02)	Инъекция	220
20.03.01	Снятие клеща	250

Пункты Перми и Пермского края:

Данные пункты работают **без выходных!**

- ул. Газеты Звезда, 30
- ул. Ленина, 10
- ул. Ленина, 82
- ул. Попова, 57
- ул. Героев Хасана, 1 **УЗИ**
- ул. 25 Октября, 40 А
- ул. Чернышевского,15
- ул. Белинского,31
- ул. Холмогорская, 4 В
- ул. Лодыгина, 26
- ул. Солдатова, 42/3
- ул. Серпуховская, 17
- ул. Революции, 5
- ул. Куйбышева,51
- ул. Куйбышева, 97
- ул. Островского, 49
- ул. 40-я Победы, 10 А (Ляды)
- ул. Василия Татищева, 8
- ул. Каляева, 20
- ул. Маршала Рыбалко, 74
- пр. Парковый, 31/1
- пр. Парковый, 28 А
- ул. Барамзиной, 38
- ул. Малкова, 12
- ул. Мильчакова, 19
- ул. Докучаева, 32
- ул. Ленина, 83
- ул. Плеханова, 58 А
- ул. Леонова, 23
- ул. Леонова, 45
- шоссе Космонавтов, 121
- пр. Декабристов, 22
- ул. Карпинского, 14
- ул. Карпинского, 50
- ул. Карпинского, 112
- ул. Вильямса, 4
- ул. Веденеева, 41
- ул. Молдавская, 4
- ул. Уральская,115/
- ул. Крупской, 26 **УЗИ**
- ул. Аркадия Гайдара,14 А
- ул. Уральская, 95
- ул. Ким, 49
- ул. Ушинского, 4
- ул. Гашкова, 20
- ул. Макаренко, 54
- ул. Уинская, 18
- ул. Сакко Ванцетти, 93 А
- ул. Целинная, 43/1
- ул. Сапфирная, 13
- ул. Восстания, 8
- ул. Камская,1 Б (Кондратово)
- ул. Нижнемуллинская, 8 (Култаево)
- ул. Победы, 18 (Усть-Качка)
- ул. Центральная, 24/1 (Лобаново)
- пгт. Звездный, ул. Ленина,16

Барда: ул. Фрунза,5
Березники: ул. Пятилетки,22; ул. Юбилейная,119; ул. И.Дощеникова,9
Губаха: ул. Кирова,3 **УЗИ**
Добрянка: ул. Советская,72
Краснокамск: ул. Чапаева,1
Кунгур: ул. Красная,21; ул. Просвещения,7 А
Кудымкар: ул. Данилова,14 А; ул. М.Горького,22
Куеда: ул. К.Маркса,14
Лысьва: ул. Металлистов,26; ул.Чапаева,21
Оса: ул. Генерала Богомягкова,8; ул. Степана Разина,81 А
Полазна: ул. Пяткина,56
Соликамск: ул. Советская,53; ул. Северная,47 (м-н Боровск)
Суксун: ул. К.Маркса,41
Уинское: ул. Коммунистическая,6
Чайковский: ул. Строительная,8; Приморский бульвар,29
Чернушка: ул. Коммунистическая,18 А; ул. Красноармейская,90 А
Чусовой: ул. Ленина,22; ул. 50 лет ВЛКСМ, 25 **NEW**

Микробиологические исследования с идентификацией микроорганизмов методом MALDI-TOF (масс-спектрометрия) на анализаторе VITEK MS (bioMeriex, Франция), с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков (диско-диффузионный метод с оценкой на экспертной системе ADAGIO (Bio-Rad, Франция)) и бактериофагам производства АО НПО «Микроген»

✓	код			цена
	23.01		Кал на дисбактериоз	2400
	23.02		Кал на условно-патогенную микрофлору (УПМФ)	2100
	23.02.01		Кал на условно-патогенные энтеробактерии (УПЭ) и энтеропатогенные кишечные палочки (ЭПКП)	2100
	23.43		Микологическое исследование (посев) кала на дрожжевые и плесневые грибы	1200
	23.03		Кал на патогенную микрофлору (сальмонеллы, шигеллы)	1200
	23.04		Кал на иерсинии	1200
	23.05		Кал на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus)	1200
	23.06		Исследование кала на определение антигенов токсинов А и В Clostridium difficile	1900
	23.06.01		Комбинированное исследование кала на определение антигенов токсинов А и В + глутаматдегидрогеназы - GDH Clostridium difficile	2100
	23.07		Моча на микрофлору (в т.ч. грибы рода Candida spp.)	1600
	23.08		Кровь на стерильность (аэробы + анаэробы) с использованием транспортной системы (взрослые и дети старше 5 лет)	2650
	23.08.00		Кровь на стерильность (аэробы + анаэробы) с использованием транспортной системы (дети до 5 лет)	2650
	23.08.01		Кровь на стерильность (аэробы) с использованием транспортной системы*	1900
	23.08.02		Кровь на стерильность (анаэробы) с использованием транспортной системы*	1900
	23.09		Кровь на гемокультуру (тиф, паратиф) с использованием транспортной системы*	2650
	23.09.01		Исследование биоматериала выпотных жидкостей (асцитной, плевральной, перикардиальной, синовиальной), ликвора, содержимого кист на микрофлору	1900
	23.09.02		Желчь на микрофлору	1900
	23.10		Мокрота, БАЛЖ на микрофлору (в т.ч. грибы рода Candida spp.)	1900
	23.11.01		Отделяемое левого уха на микрофлору (в т.ч. грибы рода Candida spp.)	1600
	23.11.02		Отделяемое правого уха на микрофлору (в т.ч. грибы рода Candida spp.)	1600
	23.12		Отделяемое носа на микрофлору (в т.ч. грибы рода Candida spp.)	1600
	23.13		Отделяемое зева на микрофлору (в т.ч. грибы рода Candida spp.)	1600
	23.14		Отделяемое миндалин на микрофлору (в т.ч. грибы рода Candida spp.)	1600
	23.27		Посев отделяемого верхних дыхательных путей (зев, нос) на Staphylococcus aureus	1250
	23.15		Исследование на дифтерийную палочку (Corynebacterium diphtheriae) зев + нос	1400
	23.32		Исследование микроценоза ротовой полости	2400
	23.33		Исследование с поверхности языка на микрофлору (в т.ч. грибы рода Candida spp.)	1600
	23.16.01		Отделяемое конъюнктивы левого глаза на микрофлору (в т.ч. грибы рода Candida spp.)	1600
	23.16.02		Отделяемое конъюнктивы правого глаза на микрофлору (в т.ч. грибы рода Candida spp.)	1600
	23.17		Отделяемое влагалища на микрофлору (в т.ч. грибы рода Candida spp.)	1600
	23.18		Отделяемое цервикального канала на микрофлору (в т.ч. грибы рода Candida spp.)	1600
	23.19		Отделяемое уретры (жен.) на микрофлору (в т.ч. грибы рода Candida spp.)	1600
	23.20		Исследование микроценоза влагалища	2400
	23.21		Отделяемое уретры (муж.) на микрофлору (в т.ч. грибы рода Candida spp.)	1600
	23.22		Исследование эякулята на микрофлору (в т.ч. грибы рода Candida spp.)	1600
	23.23		Исследование секрета простаты на микрофлору (в т.ч. грибы рода Candida spp.)	1600
	23.24.01		Исследование грудного молока (левая МЖ, одна проба) на микрофлору	1600
	23.24.02		Исследование грудного молока (правая МЖ, одна проба) на микрофлору	1600
	23.25		Исследование отделяемого других органов и тканей на микрофлору (в т.ч. грибы рода Candida spp.) (указать вид биаматериала)_____	1600
	23.27.01		Исследование на MRSA Staphylococcus aureus	1600
	23.28		Посев на стрептококк группы А (Streptococcus pyogenes)	1250
	23.29		Посев на стрептококк группы В (Streptococcus agalactiae)	1250
	23.30		Посев на гемофильную палочку (Haemophilus influenzae)	1250
	23.31		Посев отделяемого на анаэробную микрофлору (указать вид биаматериала)_____	1400

Исследования (без определения чувствительности)

23.27.02		Отделяемое зева на Staphylococcus aureus. Профилактический анализ.	850
23.27.03		Отделяемое носа на Staphylococcus aureus. Профилактический анализ.	850
23.03.01		Кал на патогенную микрофлору (сальмонеллы, шигеллы). Профилактический анализ.	850
801		Профилактический микробиологический скрининг: Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) из зева и носа + Кал на патогенную микрофлору (сальмонеллы, шигеллы)	2200

МИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

	23.37	Люминесцентная микроскопия с окрашиванием калькофлюором белым на патогенные грибы: ☐ волосы с волосяной луковицей ☐ соскоб с ногтевой пластины ☐ соскоб с кожи	850

Микологические исследования с определением чувствительности к антимикотическим препаратам

	23.26	Микологическое исследование (посев) на дрожжевые грибы (родов Candida spp., Cryptococcus spp. и других) с определением чувствительности к антимикотическим препаратам	1400
	23.42	Микологическое исследование (посев) на дрожжевые грибы (родов Candida spp., Cryptococcus spp. и других) с подбором минимальной эффективной дозировки антимикотических препаратов МПК Bio-Rad Фунгитест	2200
	23.40	Микологическое исследование (посев + микроскопия) на дрожжеподобные липофильные грибы Malassezia spp. с определением чувствительности к антимикотическим препаратам	1600
	23.41	**Комплексное микологическое исследование** (посев + микроскопия) на дерматофиты, дрожжевые грибы, дрожжеподобные грибы Malassezia spp. и плесневые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам грибов рода Candida spp. и дрожжеподобных грибов	2200

Микологические исследования без определения чувствительности к антимикотическим препаратам

	23.38	Микологическое исследование (посев + микроскопия) на плесневые грибы Aspergillus spp. без определения чувствительности к антимикотическим препаратам	1600
	23.39	Микологическое исследование (посев + микроскопия) на возбудителей дерматомикозов (Trichophyton spp., Microsporum spp., Epidermophyton spp.) без определения чувствительности к антимикотическим препаратам	1600

- При идентификации плесневых грибов чувствительность к антимикотическим препаратам не определяется.
- При получении роста нормальной микрофлоры определение антибиотикочувствительности не производится.
- Бактериофаг – чувствительность определяется у тех видов микроорганизмов, к которым есть промышленные препараты.

* для детей используют педиатрический флакон (0,5-5 мл)

Данная информация носит справочный характер и не является официальной офертой. Актуальную информацию уточняйте на сайте www.medlabexpress.perm.ru от 01.11.2026 г.

Микробиологическая лаборатория ООО «МедЛабЭкспресс» обращает внимание:

Общие требования к сбору и транспортировке проб биологического материала для микробиологических исследований:

1. Для получения достоверного результата исследования рекомендуется проводить до начала курса антимикробной терапии или не менее чем через 2 недели после его завершения.
2. Сбор биоматериала производится в стерильный пластиковый контейнер в заводской упаковке во избежание загрязнения пробы биологического материала посторонней микрофлорой, так как её наличие может привести к получению ошибочных результатов анализа.
3. Проба должна быть отобрана в количестве (вес, объём), достаточном для выполнения анализа. Недостаточное количество образца может привести к некорректным результатам исследования.
4. Доставку в лабораторию осуществляют в максимально короткие сроки в день забора билматериала. Хранение не более 2 часов при t 20-25^0 С.

1. Правила для самостоятельного сбора приносного биоматериала на микробиологические исследования

КАЛ на дисбактериоз, УПМФ, УПЭ и ЭПКП

Биоматериал необходимо собрать утром, после естественной дефекации

За 1-3 дня до взятия пробы пациент должен находиться на диете, исключающей приём продуктов, усиливающих процессы брожения в кишечнике, кисло-молочных продуктов и алкоголя.

Необходимо исключить приём слабительных препаратов, введение ректальных свечей, масел, ограничить приём медикаментов, влияющих на перистальтику кишечника (белладонна, пилокарпин) и на окраску кала (железо, висмут, сернокислый барий), в течение 72 часов до сбора кала.

Кал собирают на чистую поверхность из полиэтилена или бумаги. При использовании судна его предварительно хорошо промывают с мылом и губкой, ополаскивают многократно водопроводной водой, а потом обдают кипятком и остужают. Кал собирают в стерильный контейнер в заводской упаковке, преимущественно из средней порции, специальной ложечкой, вмонтированной в крышку стерильного контейнера. **Не менее 1/3 от объёма контейнера.** Во время сбора избегать примесей мочи, отделяемого половых органов. У маленьких детей допускается собирать материал со стерильной сухой пелёнки, не касаясь ткани.

МОКРОТА

Исследованию подлежит первая утренняя порция мокроты.

Перед откашливанием необходимо почистить зубы и прополоскать рот кипяченой водой с целью механического удаления остатков пищи и микрофлоры ротовой полости. Следите за тем, чтобы в контейнер не попала слюна и носоглоточная слизь (особенно при насморке!). Сбор биоматериала производить после глубокого откашливания (чтобы получить биоматериал из нижних дыхательных путей) в стерильный контейнер в заводской упаковке. Не касайтесь внутренней поверхности крышки и стенок стерильного контейнера пальцами. Плотно закройте контейнер крышкой.

ГРУДНОЕ МОЛОКО

Отбор грудного молока производится в день сдачи анализа, до кормления ребенка или через два часа после кормления грудью. Молоко из правой и левой молочных желёз исследуют раздельно. Молоко из молокоотсоса не подлежит исследованию!

Перед сцеживанием молока руки и молочные железы тщательно моют с мылом, обрабатывают соски и околососковую область ватными тампонами, смоченными 70% спиртом (каждая железа обрабатывается отдельным тампоном).

Начальную порцию 5-10 мл сцеживают в отдельную посуду (так как эта порция молока непригодна для исследования), последующие 4-5 мл сцеживают в стерильный контейнер, стараясь при этом не касаться краёв контейнера телом. Каждый контейнер маркируется: «правая молочная железа» или «левая молочная железа».

КАЛ на патогенную флору и иерсинии

Кал собирается в стерильный контейнер в заводской упаковке. **Не менее 1/3 от объёма контейнера.** Целесообразно 2-3 кратное обследование с целью выявления бактерионосителей. У маленьких детей допускается собирать материал со стерильной сухой пелёнки, не касаясь ткани.

МОЧА

Нельзя использовать для бактериологического анализа мочу из мочеприемника и подкладного судна.

Правила сбора мочи для женщин.

Не следует собирать мочу для бактериологического анализа у женщин в период менструации. Перед сбором мочи необходимо вымыть руки с мылом. Туалет наружных половых органов проводить тёплой водой с мылом в направлении от уретры к промежности с последующим подсушиванием салфеткой в том же направлении. Во избежание попадания в мочу выделений из влагалища женщинам рекомендуется ввести во влагалище тампон. Удерживая половые губы разведенными, выпустить небольшое количество мочи в унитаз, приостановить мочеиспускание, а затем, подставив стерильный контейнер под струю мочи, наполнить его до половины объёма, не касаясь краёв контейнера телом.

Правила сбора мочи для мужчин.

Вымыть руки с мылом. Отвести назад крайнюю плоть. Головку полового члена вымыть с мылом тёплой кипяченой водой, просушить с помощью чистой салфетки. Небольшое количество мочи выпустить в унитаз, приостановить мочеиспускание. Удерживая крайнюю плоть в отведенном положении, направить струю мочи в контейнер и наполнить его до половины объёма, при этом не касаться краёв контейнера.

Правила сбора мочи у грудных и маленьких детей.

Для сбора мочи у грудных и маленьких детей используют специальные мешки с гипоаллергенным адгезивным средством, обеспечивающим плотное прилегание к коже. Их проверяют каждые 15 мин., собранный образец переливают в контейнер для сбора мочи, который и транспортируют в микробиологическую лабораторию.

ЭЯКУЛЯТ (СПЕРМА)

При исследовании эякулята сбор биоматериала проводят до или не ранее 2-3 часов после мочеиспускания. Воздержаться от половых контактов в течение 3 дней до исследования. Исключить употребление любых спиртных и газированных напитков, острой и солёной пищи. Перед сбором необходимо провести туалет наружных половых органов. Сбор эякулята осуществляется путем мастурбации, без использования презерватива в стерильный контейнер в заводской упаковке, не касаясь головкой полового члена краёв стенок контейнера.

2. Правила подготовки к микробиологическим исследованиям при заборе биоматериала на пункте

При исследовании отделяемого ЛОР-органов:

уха - накануне и в день исследования запрещается применять мази, ушные капли и проводить туалет наружного уха. Необходимо исключить любые местные процедуры (промывание)

носовых ходов - в день исследования запрещается промывать полость носа и использовать назальные капли и спреи

слизистой оболочки зева, миндалин, поверхности языка - проводят натощак или не ранее чем через 2 часа после приёма пищи или питья, нельзя полоскать рот и горло, чистить зубы, курить

глаз - нельзя применять глазные капли и мази. Пациент приходит для взятия биоматериала в процедурный кабинет до проведения утреннего туалета

При исследовании отделяемого урогенитального тракта (мужчины и женщины)

женщинам - исследование рекомендуется проводить за 5 дней до предполагаемого начала менструации или через 5 дней после её окончания. За 3 дня до сдачи анализа исключить половые контакты. Рекомендуется не проводить за 48 часов интравагинальное УЗИ и/или кольпоскопию. За 24 часа необходимо исключить спринцевания и другие местные лечебные средства (мази, свечи).

В день исследования не проводить туалет наружных половых органов. Забор биоматериала проводят до или через 2-3 часа после мочеиспускания.

мужчинам - рекомендуется за 3 дня до сдачи анализа исключить половые контакты. В течение 3 часов до исследования воздержаться от мочеиспускания, не проводить туалет наружных половых органов.

3. Правила подготовки к микологическим исследованиям

Общие правила:

- Не принимать противогрибковые таблетки за 14–30 дней до анализа.
- Не использовать мази, кремы и спреи за 7-10 дней до анализа.
- Не обрабатывать кожу спиртом, йодом или зелёнкой в день сдачи.

За 2-3 дня:

Ногти: Снять весь лак, гель-лак и покрытия. Не использовать кремы и жидкость для снятия лака. Не стричь ногти в день сдачи.

Кожа: Не мыть поражённый участок с мылом. Не наносить косметику, пудру. Не использовать наружные лекарственные средства.

Волосы: Не мыть голову. Не использовать шампуни, маски.

Памятка носит информационный характер. При случайном нарушении правил (помыли участок, нанесли крем) сообщите об этом на регистратуре — анализ лучше перенести.

Результат выдается в виде критических значений (чувствительный, резистентный). При обнаружении микроорганизмов, составляющих нормальную микрофлору, чувствительность к антибиотикам не определяется, так как не имеет диагностического значения. При идентификации плесневых грибов чувствительность к антимикотическим препаратам не определяется.

БАКТЕРИОФАГ- чувствительность определяется у тех видов микроорганизмов, к которым есть промышленные препараты

Правила подготовки к сдаче анализов и режим работы уточняйте на сайте: **www.medlabexpress.perm.ru**